

INDIANA 2019–20

Vacunas escolares requeridas y recomendadas



Grado	Requerida	Recomendada
3 a 5 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTaP (Difteria, tétanos y tos ferina) • 3 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicela • 1 MMR (Sarampión, paperas y rubéola)
Kinder a 5to. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 MMR • 2 Hepatitis A
6to. a 7mo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (antimeningocócica) • 1 Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina)
8vo. a 11vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 1 MCV4 • 1 Tdap
12vo. grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTaP • 4 Polio • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 MMR • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 Tdap

Hep B: La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas.

DTaP: 4 dosis de DTaP/DTP/DT son aceptables si la 4ta. dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después.

Polio*: 3 dosis de polio son aceptables para todos los grados si la tercera dosis se aplicó el día en que el niño cumple 4 años de edad o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

*Para los alumnos en Kinder a 9vo. grado, la dosis final se debe aplicar el día en que el niño cumple 4 años de edad o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

Varicela: La documentación del médico sobre el historial de enfermedades, que incluya mes y año, es prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta el 11vo. grado. La información por parte de los padres sobre el historial de enfermedades es aceptable para 12vo. grado.

Tdap: No existe intervalo mínimo para la última dosis de Td.

MCV4: Las personas que reciben la primera dosis después de cumplir 16 años de edad solo necesitan una dosis de MCV4.

Hep A: El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis de Hep A para Kinder a 7mo. grado y 12vo. grado. De 3 a 5 años de edad y los grados 8vo. A 11vo., se recomiendan dos dosis de vacuna contra Hep A.

División de Vacunas del Departamento de Salud del Estado de Indiana | (800) 701-0704

El número junto a la vacuna indica la cantidad de dosis acumuladas necesarias.

